

Extrait de busserole

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 4 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Urocystil comprimés pelliculés et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Urocystil comprimés pelliculés ?
3. Comment prendre Urocystil comprimés pelliculés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Urocystil comprimés pelliculés ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE UROCYSTIL COMPRIMÉS PELLICULÉS ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Urocystil est un médicament traditionnel à base de plantes, utilisé chez les femmes adultes pour soulager les symptômes d'infection urinaire légère, tels que la sensation de brûlure en urinant, ainsi que le besoin pressant et répété d'uriner.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE UROCYSTIL COMPRIMÉS PELLICULÉS ?

Ne prenez jamais Urocystil

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- si vous souffrez d'une maladie des reins.

Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Urocystil.
- Urocystil n'est pas recommandé chez les hommes, les enfants et les jeunes gens de moins de 18 ans, sauf avis médical.
- En cas d'apparition de symptômes tels que de la fièvre, de la difficulté à uriner, des spasmes douloureux ou la présence de sang dans les urines, consultez immédiatement votre médecin traitant ou votre pharmacien.
- Lors de l'utilisation de Urocystil, vous pourriez constater une coloration brun-vert de vos urines. Il s'agit d'un phénomène normal, dû à l'un des composants contenus dans Urocystil.

Enfants et adolescents

Urocystil n'est pas recommandé chez les enfants et les jeunes gens de moins de 18 ans, sauf avis médical.

Autres médicaments et Urocystil

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments même s'il s'agit de médicaments obtenus sans ordonnance.

Urocystil avec des aliments et boissons

La prise simultanée d'aliments acidifiant les urines diminue l'activité antibactérienne.

Les aliments acidifiants sont par exemple des fruits et jus de fruits acides (agrumes, abricots, prunes).

Grossesse et allaitement

La sécurité d'emploi pendant la grossesse et l'allaitement n'a pas été établie.

Il y a lieu d'éviter l'utilisation de Urocystil pendant la grossesse.

En l'absence de données suffisantes, l'emploi de ce médicament est déconseillé pendant l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Pas de données disponibles.

3. COMMENT PRENDRE UROCYSTIL COMPRIMÉS PELLICULÉS ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La dose recommandée chez les femmes adultes est de 2 comprimés 3 fois par jour.

Les comprimés doivent être avalés avec un grand verre d'eau.

La durée du traitement ne doit pas dépasser une semaine, sauf avis médical.

En cas de persistance des symptômes après 4 jours de traitement, ou de leur aggravation durant l'utilisation de Urocystil, informez votre médecin traitant ou votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de Urocystil que vous n'auriez dû

Si vous (ou quelqu'un d'autre) avez pris un nombre important de comprimés en même temps, ou si pensez qu'un enfant a avalé l'un des comprimés, contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245).

Il n'y a pas eu de cas de surdosage décrit.

Si vous oubliez de prendre Urocystil

Prenez les comprimés dès que vous vous apercevez de l'omission, sauf s'il est presque l'heure de la dose suivante. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Urocystil

Si vous arrêtez le traitement par Urocystil plus tôt que prévu, cela ne devrait pas provoquer l'apparition d'effets indésirables. Toutefois, les symptômes qui vous ont conduit à prendre Urocystil pourraient réapparaître.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, Urocystil peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Des cas de nausées, vomissements et douleurs gastriques ont été signalés.

Il se peut que les urines soient colorées en brun-vert.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

EUROSTATION II

Place Victor Horta, 40/40

B-1060 Bruxelles

Site internet: www.afmps.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER UROCYSTIL COMPRIMÉS PELLICULÉS ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage extérieur après «EXP». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver dans l'emballage d'origine.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Urocystil

La substance active est l'extrait sec de feuille de busserole. Chaque comprimé contient 400 mg d'extrait sec de *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng., folium (feuille de busserole) (3,5-5,5:1), équivalent à 64-96 mg d'arbutine.

Solvant d'extraction : Ethanol 60 % V/V.

Les autres composants sont :

Noyau du comprimé : cellulose microcristalline, hydrogénophosphate de calcium dihydraté, amidon pré-gélatinisé, talc, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

Pelliculage du comprimé : alcool polyvinylique, talc, macrogol, dioxyde de titane (E171).

Aspect de Urocystil et contenu de l'emballage extérieur

Urocystil se présente sous forme de comprimés pelliculés de teinte blanche, de forme oblongue et biconvexe.

Urocystil est disponible en emballages de 42 comprimés.

Titulaire de l'enregistrement et fabricant

Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, Belgique

Numéro de l'enregistrement : BE-TU483111

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : 11/2015
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : 11/2015

TILMAN SA/NV • B-5377 Baillonville

Berendruifblad extract

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan ? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 4 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger ? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Urocystil filmomhulde tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt ?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voor zichtig mee zijn ?
3. Hoe gebruikt u dit middel ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel ?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

1. WAT IS UROCYSTIL FILMOMHULDE TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT ?

Urocystil is een traditioneel kruideneesmiddel dat door volwassen vrouwen wordt gebruikt om de symptomen van milde urineweginfecties te verlichten, zoals een branderig gevoel tijdens het urineren, alsmede een dringende en herhaalde behoefte om te urineren.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN ?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken ?

- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- als u een nierziekte heeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel ?

- Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

- Urocystil wordt niet aanbevolen voor mannen, kinderen en jongeren onder de 18 jaar, tenzij op medisch advies.
- Als u symptomen heeft zoals koorts, moeite met urineren, pijnlijke krampen of bloed in de urine, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of apotheker.
- Bij het gebruik van Urocystil kan uw urine een groenbruine kleur krijgen. Dit is een normaal verschijnsel dat door één van de ingrediënten van Urocystil veroorzaakt wordt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Urocystil wordt niet aanbevolen voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar, tenzij op medisch advies.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen ?

Neemt u naast Urocystil nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen ? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken ?

Gelijktijdige inname van voedsel dat de urine aanzuurt vermindert de antibacteriële activiteit.

Verzurende voedingsmiddelen zijn onder andere zure vruchten en vruchtensappen (citrusvruchten, abrikozen, pruimen).

Zwangerschap en borstvoeding

De veiligheid voor gebruik tijdens de zwangerschap en de borstvoeding is niet vastgesteld.

Het is noodzakelijk om het gebruik van Urocystil tijdens de zwangerschap te vermijden.

Door het gebrek aan voldoende gegevens wordt het gebruik van dit geneesmiddel tijdens het geven van borstvoeding afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Geen gegevens beschikbaar.

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN ?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosis voor volwassen vrouwen is 2 tabletten 3 maal per dag.

Vervolg aan keerzijde



De tabletten dienen met een vol glas water te worden ingenomen.

De duur van de behandeling mag niet meer zijn dan één week, tenzij op medisch advies.

Indien de symptomen na 4 dagen behandeling aanhouden of verergeren tijdens het gebruik van Urocytil, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt ?

Als u (of iemand anders) te veel Urocytil heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Er zijn geen gevallen van overdosering beschreven.

Bent u vergeten dit middel in te nemen ?

Neem de tabletten in zodra u het verzuim merkt, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u voortijdig stopt met Urocytil, zou dit geen bijwerkingen moeten veroorzaken. Echter, de symptomen waarvoor u Urocytil nam kunnen evenwel terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Er zijn gevallen van misselijkheid, braken en buikpijn gemeld.

Het kan zijn dat u groenbruine urine krijgt.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via :

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/40 B-1060 Brussel

Website : www.fagg.be

e-mail : patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit

geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL ?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking na «EXP». Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel ?

De werkzame stof in dit middel is berendruif droogextract. Iedere tablet bevat 400 mg droogextract van *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng., folium berendruifblad (3,5-5,5:1), overeenkomend met 64-96 mg arbutine.

Extractiemiddel : ethanol 60 % V/V.

De andere stoffen in dit middel zijn :

Kern van de tablet : microkristallijne cellulose, calciumhydrogenofosfaat dihydraat, gepregelateerd zetmeel, talk, colloïdaal anhydrysch silicium, magnesiumstearaat.

Filmomhulling : polyvinylalcohol, talk, macrogol, titanium dioxide (E171).

Hoe ziet Urocytil eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?

Witte, langwerpige, biconvexe filmomhulde tabletten.

Urocytil is beschikbaar in dozen met 42 tabletten.

Houder van de registratie en fabrikant

Tilman n.v., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, België

Nummer van de registratie : BE-TU483111

Afleveringswijze

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in : 11/2015

De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is : 11/2015

TILMAN SA/NV • B-5377 Baillonville



DE

Urocytil®

Filmtabletten

Bärentraube-Trockenextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Urocytil Filmtabletten und wofür wird es angewendet ?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Urocytil Filmtabletten beachten ?
3. Wie ist Urocytil Filmtabletten einzunehmen ?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich ?
5. Wie ist Urocytil Filmtabletten aufzubewahren ?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

1. WAS IST UROCYTIL FILMTABLETTEN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Urocytil ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das bei erwachsenen Frauen zur Linderung der Symptome einer leichten Harnwegsinfektion angewendet wird, wie einem Brennen beim Wasserlassen sowie einem dringenden und vermehrten Harndrang.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON UROCYTIL FILMTABLETTEN BEACHTEN ?

Urocytil darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind;
- wenn Sie an einer Nierenerkrankung leiden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Urocytil einnehmen.
- Die Anwendung von Urocytil bei Männern, Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ohne Hinzuziehen eines Arztes wird nicht empfohlen.
- Wenn sich Symptome wie Fieber, Probleme beim Wasserlassen, schmerzhaftes Krämpfen oder Blut im Urin einstellen, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren behandelnden Arzt oder Apotheker.
- Bei Anwendung von Urocytil werden Sie möglicherweise eine grünbraune Färbung Ihres Urins feststellen. Dabei handelt es sich um ein normales Phänomen, das von einem der Bestandteile von Urocytil verursacht wird.

Kinder und Jugendliche

Die Anwendung von Urocytil bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ohne Hinzuziehen eines Arztes wird nicht empfohlen.

Einnahme von Urocytil zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Einnahme von Urocytil zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die gleichzeitige Einnahme von Nahrungsmitteln, die den Urin ansäuern, verringert die antibakterielle Wirkung.

Säuernde Nahrungsmittel sind z. B. saure Früchte und Fruchtsäfte (Zitrusfrüchte, Aprikosen, Pflaumen).

Schwangerschaft und Stillzeit

Die Sicherheit der Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht erwiesen.

Die Anwendung von Urocytil während der Schwangerschaft sollte daher vermieden werden.

Aufgrund des Fehlens ausreichender Daten wird von der Anwendung dieses Arzneimittels während der Stillzeit abgeraten.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es stehen keine relevanten Daten zur Verfügung.

3. WIE IST UROCYTIL FILMTABLETTEN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis für erwachsene Frauen beträgt 3-mal täglich 2 Tabletten.

Die Tabletten sollten unzerkaut mit einem großen Glas Wasser eingenommen werden.

Dieses Arzneimittel soll ohne ärztlichen Rat nicht länger als jeweils 1 Woche eingenommen werden.

Wenn die Symptome nach 4 Tagen Behandlung anhalten oder sich während der Anwendung von Urocytil eine Verschlechterung der Symptome einstellt, informieren Sie Ihren behandelnden Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie eine größere Menge von Urocytil eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie (oder eine andere Person) zu viel Urocytil eingenommen haben, kontaktieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder die Giftnotrufzentrale (070/245.245).

Es liegen keine Berichte über Überdosierungen vor.

Wenn Sie die Einnahme von Urocytil vergessen haben

Nehmen Sie die Tabletten ein, sobald Sie bemerken, dass Sie die Einnahme vergessen haben, außer wenn es nahezu Zeit für die nächste Dosis ist.

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Urocytil abbrechen

Wenn Sie die Behandlung mit Urocytil früher als geplant einstellen, sollte dies keine Nebenwirkungen hervorrufen. Die Symptome, für die Sie Urocytil eingenommen haben, können allerdings wieder auftreten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH ?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es wurde von Fällen von Übelkeit, Erbrechen und Magenschmerzen berichtet.

Möglicherweise färbt sich der Urin grünbraun.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über :

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
Abteilung Vigilanz

EUROSTATION II

Victor Hortaplein, 40/40, B-1060 BRUSSEL

Website : www.fagg-afmps.be

E-Mail : patientinfo@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST UROCYTIL FILMTABLETTEN AUFZUBEWAHREN ?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach «EXP» angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

In der Originalverpackung aufbewahren.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Urocytil enthält

Der Wirkstoff ist Bärentraube-Trockenextrakt. Jede Tablette enthält 400 mg Trockenextrakt aus *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng., folium (Bärentraube) (3,5-5,5:1), was 64-96 mg Arbutin entspricht.

Extraktionslösungsmittel : Ethanol 60 % V/V.

Die sonstigen Bestandteile sind :

Tablettenkern : mikrokrystalline Cellulose, Kalziumdihydrathydrogenphosphat, vorverkleisterte Stärke, Talkum, wasserfreie kolloidale Kieselerde, Magnesiumstearat.

Tablettenüberzug : Polyvinylalkohol, Talkum, Macrogol, Titandioxid (E171).

Wie Urocytil aussieht und Inhalt der Packung

Urocytil sind längliche, biconvexe, weiße Filmtabletten. Urocytil ist in Packungen mit 42 Tabletten erhältlich.

Registrierungsinhaber und Hersteller

Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, Belgien

Registrierungsnummer : BE-TU483111

Abgabe : Nicht verschreibungspflichtig.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im : 11/2015

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im : 11/2015

TILMAN SA/NV • B-5377 Baillonville

