

# Thymo septine®

comprimés pelliculés

## Extrait sec de thym

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Thymoseptine, comprimés pelliculés et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Thymoseptine, comprimés pelliculés ?
3. Comment prendre Thymoseptine, comprimés pelliculés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Thymoseptine, comprimés pelliculés ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE THYMOSEPTINE, COMPRIMÉS PELLICULÉS ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Thymoseptine est utilisé comme expectorant en cas de toux associée à un refroidissement.

Thymoseptine est un médicament traditionnel à base de plantes. Son utilisation est réservée aux indications spécifiées sur la base exclusive de l'ancienneté de l'usage.

Ce médicament est indiqué chez les adultes et les enfants à partir de 12 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE THYMOSEPTINE, COMPRIMÉS PELLICULÉS ?

#### Ne prenez jamais Thymoseptine :

- si vous êtes allergique au thym ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- si vous êtes allergique à d'autres plantes appartenant à la famille des Lamiacées.

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Thymoseptine.

Vous devez informer votre médecin ou votre pharmacien dans les cas suivants :

- si vous constatez des signes d'infection (fièvre, expectorations purulentes).
- si vous éprouvez des difficultés à respirer.

#### Enfants et adolescents

L'utilisation de Thymoseptine n'est pas recommandée chez les enfants de moins de 12 ans.

#### Autres médicaments et Thymoseptine

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

#### Thymoseptine avec des aliments et boissons

Non applicable.

#### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

On ne dispose pas de données suffisantes pour exclure les effets néfastes éventuels pendant la grossesse ou l'allaitement. L'utilisation de Thymoseptine n'est pas recommandée durant ces périodes.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il n'a pas été montré que Thymoseptine pouvait altérer la conduite automobile ou l'utilisation de machines.

### 3. COMMENT PRENDRE THYMOSEPTINE, COMPRIMÉS PELLICULÉS ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de 1 comprimé 3 fois par jour.

Les comprimés sont à avaler avec un grand verre d'eau.

Ne prenez pas ce médicament plus d'une semaine sans avis médical, si les symptômes subsistent ou en cas d'apparition de fièvre.

#### Si vous avez pris plus de Thymoseptine que vous n'auriez dû

Prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245).

En cas de surdosage, un traitement symptomatique s'impose.

#### Si vous oubliez de prendre Thymoseptine

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

#### Si vous arrêtez de prendre Thymoseptine

Les troubles peuvent éventuellement réapparaître.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Des réactions d'hypersensibilité (incluant un cas de choc anaphylactique et un cas d'oedème de Quincke) ainsi que des troubles gastriques ont été observés. Leur fréquence n'est pas connue.

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/40 B-1060 Bruxelles

Site internet: www.afmps.be • E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### 5. COMMENT CONSERVER THYMOSEPTINE, COMPRIMÉS PELLICULÉS ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption mentionnée sur l'emballage après la mention « EXP ». La date d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.

Conserver Thymoseptine dans l'emballage d'origine.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation concernant la température.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

### 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

#### Ce que contient Thymoseptine

La substance active est l'extrait sec de feuilles et fleurs de thym (*Thymus vulgaris* L.). Chaque comprimé contient 200 mg d'extrait de thym, ce qui correspond à 1,2 g - 2,0 g de thym. Solvant d'extraction : Ethanol 70% V/V. Les autres composants sont :

*Noyau du comprimé* : cellulose microcristalline, carboxyméthylamidon sodique, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre.

*Pelliculage du comprimé* : polydextrose, hypromellose, dioxyde de titane (E171), triglycérides à chaîne moyenne, laque aluminique jaune de quino-léine (E104), laque aluminique bleu brillant FCF (E133).

Excipient utilisé dans l'extrait : maltodextrine.

#### Aspect de Thymoseptine et contenu de l'emballage extérieur

Comprimé pelliculé vert pâle de forme oblongue.

Thymoseptine est disponible en boîtes de 20 comprimés en plaquettes thermoformées PVC/PE/PVDC-aluminium.

#### Titulaire de l'enregistrement et fabricant

Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, Belgique

Numéro de l'enregistrement : BE-TU475680

Mode de délivrance : Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : 09/2015

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : 03/2016

TILMAN s.a. - Z.I. Sud 15 - B-5377 Baillonville

# Thymo septine®

filmomhulde tabletten

## Tijm droog extract

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen ? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan ? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen gebruik niet minder, of wordt hij zelfs erger ? Neem dan contact op met uw arts.

### Inhoud van deze bijsluiter :

1. Wat is Thymoseptine, filmomhulde tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt ?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn ?
3. Hoe neemt u dit middel in ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel ?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

### 1. WAT IS THYMOSEPTINE, FILMOMHULDE TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT ?

Thymoseptine wordt gebruikt als slijmoplossend middel bij hoest tijdens een verkoudheid.

Thymoseptine is een traditioneel kruideneensmiddel. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op het langdurige gebruik.

Dit geneesmiddel is aangewezen voor gebruik bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

### 2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN ?

#### Wanneer mag u dit middel niet gebruiken ?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U bent allergisch voor andere planten die behoren tot de familie Lamiaceae.

#### Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel ?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

U moet uw arts of apotheker verwittigen als :

- u tekenen van infectie (koorts, etterige slijmen) ervaart.
- u problemen hebt met ademen.

#### Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Het gebruik van Thymoseptine is niet aangewezen bij kinderen jonger dan 12 jaar.

#### Neemt u nog andere geneesmiddelen in ?

Neemt u naast Thymoseptine nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

#### Waarom moet u letten met eten en drinken ?

Niet van toepassing.

#### Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om mogelijke nadelige effecten tijdens de zwangerschap of borstvoeding uit te sluiten. Het gebruik van Thymoseptine wordt tijdens deze periodes niet aanbevolen.

## Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen studies uitgevoerd naar de effecten op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

### 3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN ?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is 1 tablet 3 maal per dag.

De tabletten dienen met een vol glas water te worden ingenomen.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer dan een week zonder medisch advies, als de symptomen aanhouden of in geval van koorts.

#### Heeft u te veel van dit middel ingenomen ?

Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

In geval van overdosering is een symptomatische behandeling nodig.

#### Bent u vergeten dit middel in te nemen ?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

#### Als u stopt met het innemen van dit middel

De aandoening kan eventueel terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Er zijn overgevoeligheidsreacties (waaronder gevallen van anafylactische shock en angio-oedeem) en maagstoornissen waargenomen. De frequentie is niet bekend.

#### Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via :

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten  
Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/40 B-1060 Brussel  
Website: www.fagg.be • E-mail : patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

### 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL ?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking na « EXP ». De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

### 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

#### Welke stoffen zitten er in dit middel ?

De werkzame stof in dit middel is droog extract van bladeren en bloemen van tijm (*Thymus vulgaris* L.). Iedere tablet bevat 200 mg extract van tijm (equivalent aan 1,2 g - 2,0 g van tijm). Extractie solvent: Ethanol 70% V/V.

De andere stoffen in dit middel zijn :

**Kern van de tablet :** microkristallijne cellulose, carboxymethylammoniumnatrium, magnesiumstearaat, colloïdaal anhydrysch silicium.

**Filmomhulling :** polydextrose, hypromellose, titaniumdioxide (E171), triglyceriden met middelmatige ketenlengte, chinolinegeel aluminium verflak (E104), briljantblauw FCF aluminium verflak (E133).

Hulpstof in het extract : maltodextrine.

#### Hoe ziet Thyloseptine, filmomhulde tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?

Matte groengekleurde, langwerpige filmomhulde tabletten.

Thyloseptine is beschikbaar in PVC/PE/PVDC-aluminium blisterverpakkingen met 20 tabletten per omdoos.

#### Houder van de registratie en fabrikant

Tilman n.v., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, België

#### Nummer van de registratie :

BE-TU475680

**Afleveringswijze :** Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in : 09/2015  
De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is : 03/2016

TILMAN s.a. - Z.I. Sud 15 - B-5377 Baillonville



# DE Thymo septine®

Filmtabletten

## Thymian-Trockenextract

### Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Thyloseptine Filmtabletten und wofür wird es angewendet ?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Thyloseptine Filmtabletten beachten ?
3. Wie ist Thyloseptine Filmtabletten einzunehmen ?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich ?
5. Wie ist Thyloseptine Filmtabletten aufzubewahren ?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

#### 1. WAS IST THYLOSEPTINE FILMTABLETTEN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET ?

Thyloseptine wird angewendet zur Schleimlösung bei Husten in Zusammenhang mit einer Erkältung.

Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON THYLOSEPTINE FILMTABLETTEN BEACHTEN ?

##### Thyloseptine darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Thymian oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind;
- wenn Sie allergisch gegen ein anderes Mitglied aus der Lamiaceae-Familie.

##### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Thyloseptine einnehmen.

Sie müssen bei Eintreten einer der folgenden Situationen Ihren Arzt oder Apotheker informieren :

- wenn Sie Symptome einer Infektion bemerken (Fieber, eitriger Schleimauswurf).
- wenn Sie Atemschwierigkeiten haben.

##### Kinder und Jugendliche

Für Kinder unter 12 Jahren wird Thyloseptine nicht empfohlen.

##### Einnahme von Thyloseptine zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

##### Einnahme von Thyloseptine zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Unzutreffend.

##### Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es stehen nicht genügend Daten zur Verfügung, um eventuelle verhängnisvolle Auswirkungen während der Schwangerschaft oder Stillzeit auszuschließen. Die Anwendung von Thyloseptine während der Schwangerschaft oder Stillzeit wird nicht empfohlen.

#### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Eine Auswirkung von Thyloseptine auf die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen wurde nicht festgestellt.

#### 3. WIE IST THYLOSEPTINE FILMTABLETTEN EINZUNEHMEN ?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt 1 Tablette 3 mal täglich.

Die Tabletten sollten unzerkaut mit einem großen Glas Wasser eingenommen werden.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel nicht für mehr als eine Woche ohne Hinzuziehen eines Arztes ein, wenn die Symptome anhalten oder wenn sich Fieber einstellt.

#### Wenn Sie eine größere Menge von Thyloseptine eingenommen haben, als Sie sollten

Kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder die Antigiftzentrum (070/245.245).

Bei Überdosierung ist eine symptomatische Behandlung erforderlich.

#### Wenn Sie die Einnahme von Thyloseptine vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

#### Wenn Sie die Einnahme von Thyloseptine abbrechen

Die Beschwerden können möglicherweise wieder auftreten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Allergische Reaktionen und Magen-Darm-Beschwerden wurden beobachtet. Die Häufigkeit des Auftretens ist nicht bekannt.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über :

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte  
Abteilung Vigilanz, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/40, B-1060 BRUSSEL  
Website: www.fagg-afmps.be • E-Mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### 5. WIE IST THYLOSEPTINE FILMTABLETTEN AUFZUBEWAHREN ?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Packung nach den Buchstaben « EXP » angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

In der Originalverpackung aufbewahren.

Für dieses Arzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

#### 6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

##### Was Thyloseptine enthält

Der Wirkstoff ist Trockenextrakt aus Thymiankraut (*Thymus vulgaris* L.). Jede Tablette enthält 200 mg Thymian Extrakt, was 1,2 g - 2,0 g Thymiankraut entspricht. Auszugsmittel: Ethanol 70 % V/V.

Die sonstigen Bestandteile sind :

**Tablettenkern :** mikrokristalline Cellulose, Natriumcarboxymethylstärke, Magnesiumstearat, wasserfreie kolloidale Kieselerde.

**Tablettenüberzug :** Polydextrose, Hypromellose, Titandioxid (E171), mittelkettige Triglyceride, Chinolingelb Lack (E104), Brillantblau FCF Lack (E133).

Hilfsstoff des Extrakts : Maltodextrin.

##### Wie Thyloseptine aussieht und Inhalt der Packung

Blaugrüne, längliche Filmtablette.

Thyloseptine ist in Schachteln mit 20 Tabletten in PVC/PE/PVDC-Aluminium Blisterpackungen.

##### Registrierungsinhaber und Hersteller

Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, Belgien

##### Registrierungsnummer :

BE-TU475680

**Abgabe :** Nicht verschreibungspflichtig.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in : 09/2015  
De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is : 03/2016

TILMAN s.a. - Z.I. Sud 15 - B-5377 Baillonville

